

特別な状況のワクチンスケジュール(成人):全体版

この表は、米国疾病管理予防センター（CDC）「医療的状況または他の状況での成人のワクチンスケジュール」を参考にして作成しています。
 「こどもとおとなのワクチンサイト」内の「特別な状況のワクチンスケジュール」本文の各ワクチンの脚注とともにご利用ください。
 なお、日本で承認されていない、または適応外のワクチンは※をつけています。詳細はこれらのワクチンを扱っている医療施設等にご確認ください。

ワクチン	免疫不全状態 (HIV感染を除く)	HIV感染 CD4+数(細胞数/μL)		無脾症、脾臓摘出、 持続性補体欠損症	腎不全、 人工透析患者	心疾患、肺疾患、 慢性のアルコール依存症	糖尿病	慢性肝疾患	男性同性間性的接触者 (MSM; Men who have Sex with Men)	B型肝炎キャリア の家族や観望者	医療従事者	妊婦	
		200未満	200以上										
インフルエンザ		毎年1回接種											
麻しん風しん混合 (MR)	禁忌	状況によって1回または2回接種										禁忌	
おたふくかぜ	禁忌	状況によって1回または2回接種										禁忌	
水痘	禁忌	2回接種										禁忌	
肺炎球菌 (PCV13) ※ (日本での適応は生後2か月-6歳未満および65歳以上)		1回接種				1回接種							
肺炎球菌 (PPSV23)		状況によって1-3回接種							状況によって1-3回接種				
ヒブ※ (日本での適応は生後2か月-5歳未満)	造血幹細胞移植後は3回	1回接種	1回接種	1回接種									
A型肝炎	ワクチンの種類によって2回または3回							ワクチンの種類によって2回または3回		ワクチンの種類によって2回または3回			
B型肝炎	3回接種	3回接種	3回接種	3回接種	3回接種	3回接種						3回接種	
髄膜炎菌 (MenACWY)	状況によって1回またはそれ以上	状況によって1回またはそれ以上			状況によって1回またはそれ以上								
ヒトパピローマウイルス (HPV) : 女性に	26歳までに3回接種									26歳までに3回接種			
ヒトパピローマウイルス (HPV) : 男性に※	26歳までに3回接種			21歳までに3回接種				26歳までに3回接種		21歳までに3回接種			
Td/Tdap ※	Tdの代わりにTdapを1回接種し、その後10年毎にTdを1回追加接種											妊娠毎にTdap 1回接種	
髄膜炎菌 (MPSV4) ※	状況によって1回またはそれ以上	状況によって1回またはそれ以上			状況によって1回またはそれ以上								
髄膜炎菌 (MenB) ※	ワクチンの種類によって2回または3回			ワクチンの種類によって2回または3回		ワクチンの種類によって2回または3回							
帯状疱疹※	禁忌	1回接種										禁忌	

	接種歴や過去の感染歴がない、または不明の場合にワクチン接種を推奨する
	併存疾患がある、または適応がある場合にワクチン接種を推奨する
	禁忌 (接種してはいけない)
	推奨なし

それぞれのワクチンについての脚注は「こどもとおとなのワクチンサイト」内の「特別な状況のワクチンスケジュール」本文に記載しています

参考サイト
 米国疾病管理予防センター（CDC）. 医療的状況または他の状況での成人のワクチンスケジュール. (英語) <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult-conditions.html>